

Studijní program: Matematika

Studijní obor: Finanční a pojistná matematika

Řešení vzorového zadání

Příklad 1 (25 bodů)


V množině M mohou ležet pouze body splňující $x \in (0, 2)$, $y \in (0, 4)$, $z \in (0, 4)$. Budeme integrovat nejprve podle z , potom podle y a nakonec podle x (díky Fubiniově větě lze pořadí integrace libovolně měnit). Je-li pevně dáno $x \in (0, 2)$, máme omezení $y+z < 2(2-x)$ pro $z \in (0, 4)$, tedy $0 < y < 2(2-x)$. Je-li pevně dáno $x \in (0, 2)$ a $0 < y < 2(2-x)$, z musí splňovat $0 < z < 2(2-x) - y$.

Počítáme

$$\begin{aligned} \int_M \frac{y}{2-x} dx dy dz &= \int_0^2 \frac{1}{2-x} \int_0^{2(2-x)} y \int_0^{2(2-x)-y} 1 dz dy dx \\ &= \int_0^2 \frac{1}{2-x} \int_0^{2(2-x)} y[2(2-x) - y] dy dx \\ &= \frac{4}{3} \int_0^2 (2-x)^2 dx = \frac{32}{9}. \end{aligned}$$

Příklad 2 (25 bodů)

Množina M je podmnožinou $\langle 0, 1 \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$ a je tedy omezená. Protože je také uzavřená, je v \mathbb{R}^2 kompaktní. Protože $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, f je spojitá na M . Z toho plyne, že f musí na M nabývat své minimální a maximální hodnoty.



Body podezřelými z nabývání extrémů, jsou jednak kritické body funkce f ležící v M^0 (uvnitř M), jednak body na hranici $H(M) = M - M^0$.

Kritické body uvnitř M :

Protože soustava rovnic

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y^2 = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y(1+x) = 0$$

nemá v M^0 řešení, je $\max_M f = \max_{H(M)} f$ a $\min_M f = \min_{H(M)} f$.

Body na hranici M :

Hranici $H(M)$ rozepíšme jako sjednocení tří disjunktních množin $H(M) = H_1 \cup H_2 \cup H_3$, kde $H_1 = \{[x, y]; x \in \langle 0, 1 \rangle, y = 0\}$, $H_2 = \{[x, y]; x = 0, y \in (0, 1)\}$, $H_3 = \{[x, y]; x \in (0, 1), y \in (0, 1), x^2 + y^2 = 1\}$.

Protože $f(x, y) \geq 0$ na M , jsou body množiny M , v nichž $f(x, y) = 0$, body minima f na M . Snadno vidíme, že f nabývá minima v M právě když $[x, y] \in H_1$.

Na H_2 je $f(x, y) = f(0, y) = y^2$. Tato funkce v H_2 nabývá maximální hodnoty 1 v bodě $[0, 1]$. Tento bod zařadíme mezi body podezřelé z nabývání maxima.

K vyhledání podezřelých bodů v H_3 použijeme metodu Lagrangeových multiplikátorů. Lagrangeova funkce má tvar $L(x, y, \lambda) = y^2 + xy^2 - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$. Řešíme soustavu tří rovnic o třech neznámých

$$\frac{\partial L(x, y, \lambda)}{\partial x} = y^2 - 2\lambda x = 0, \quad \frac{\partial L(x, y, \lambda)}{\partial y} = 2y(x - \lambda + 1) = 0, \quad \frac{\partial L(x, y, \lambda)}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

Soustava má tři řešení, z nichž jen jedno leží v H_3 , a sice $[\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{8}}{3}]$ ($\lambda = 4/3$). Funkční hodnota v tomto bodě je $32/27$.

Srovnáním hodnot f v bodech $[0, 1]$ a $[\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{8}}{3}]$ zjistíme, že $\max_M f = f(\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{8}}{3}) = 32/27$.

Shrnutí:

- Funkce f nabývá na množině M maxima v bodě $[\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{8}}{3}]$. Její maximální hodnota je $32/27$.
- Funkce f nabývá na množině M minima v bodech $[x, 0]$ pro $x \in \langle 0, 1 \rangle$. Její minimální hodnota je 0.

Příklad 3 (25 bodů)

(i) Máme

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = c_\theta \int_0^{\infty} \frac{x}{(1+x)^{\theta+2}} dx = 1.$$

Proveďme substituci $z = 1/(1+x)$ a počítejme

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{(1+x)^{\theta+2}} dx = \int_0^1 z^{\theta-1}(1-z) dz = \frac{1}{\theta} - \frac{1}{\theta+1} = \frac{1}{\theta(\theta+1)}.$$

Je tedy $c_\theta = \theta(\theta+1)$.

(ii)

Věrohodnostní funkce: $L(\theta) = [\theta(\theta+1)]^n \prod_{i=1}^n \frac{X_i}{(1+X_i)^{\theta+2}}$

Logaritmická věrohodnost: $\ell(\theta) = n[\log \theta + \log(\theta+1)] + \sum_{i=1}^n \log X_i - (\theta+2) \sum_{i=1}^n \log(1+X_i)$

Skórová statistika: $U(\theta) = \frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + \frac{n}{\theta+1} - \sum_{i=1}^n \log(1+X_i)$

Skórová funkce: $U_i(\theta) = \frac{1}{\theta} + \frac{1}{\theta+1} - \log(1+X_i)$

Věrohodnostní rovnice: $U(\hat{\theta}) = 0$ neboli $\frac{n}{\hat{\theta}} + \frac{n}{\hat{\theta}+1} = \sum_{i=1}^n \log(1+X_i) \equiv S_X$

Rovnici $\frac{n}{\theta} + \frac{n}{\theta+1} = S_X$, kde $S_X > 0$, upravíme na tvar $S_X \hat{\theta}^2 + (S_X - 2)\hat{\theta} - 1 = 0$. Ta má dvě řešení: jedno je záporné a jedno,

$$\hat{\theta} = \frac{2 - S_X + \sqrt{S_X^2 + 4}}{2S_X},$$

je kladné. Je to maximálně věrohodný odhad, neboť $-\frac{\partial U(\theta)}{\partial \theta} > 0 \quad \forall \theta > 0$.

(iii) Fisherova míra informace jest

$$E - \frac{\partial U_i(\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta^2} + \frac{1}{(\theta + 1)^2}.$$

Příklad 4 (25 bodů)

(i) Portfolio je soubor finančních aktiv. Je reprezentováno podíly (alokací, diverzifikací), které investor investuje do jednotlivých aktiv. Označíme-li $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)^\top$ tyto podíly, pak při investovaném bohatství ve výši 1 musí platit $x_1 + \dots + x_N = 1$.

(ii) Nechť $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_N)^\top$ označuje výnosy aktiv $1, \dots, N$. Výnos portfolio \mathbf{x} je $\mathbf{R}^\top \mathbf{x}$. Očekávaný výnos portfolio je $r_p = E \mathbf{R}^\top \mathbf{x} = \mathbf{r}^\top \mathbf{x}$ a rozptyl výnosu portfolio je $\sigma_p^2 = \text{var } \mathbf{R}^\top \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{V} \mathbf{x}$.

(iii) V tomto případě je $\mathbf{r} = (8, 14)^\top$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^\top$, $\sigma_p^2 = 9(x_1^2 - 2x_1x_2 + 4x_2^2)$. S ohledem na podmínku $x_1 + x_2 = 1$ je $\sigma_p^2 = 9(7x_1^2 - 10x_1 + 4)$. Tato funkce je konvexní, minimum tudíž nastává tam, kde je derivace rovna nule

$$\frac{\partial \sigma_p^2}{\partial x_1} = 126x_1 - 90 \stackrel{!}{=} 0,$$

což dává optimální váhu $x_1^* = 5/7$, takže $x_2^* = 2/7$, optimální portfolio je tedy $\mathbf{x}^* = (5/7, 2/7)^\top$ a očekávaný výnos je $r_p^* = \frac{5}{7} \cdot 8 + \frac{2}{7} \cdot 14 = 9.71$.